


APROBADO

Por Mercedes Feo fecha 14:55 , 20/10/2008

POTENCIATOR® 5g Aspartato de arginina

FORMA FARMACÉUTICA: Solución oral en ampollas bebibles.

COMPOSICIÓN: Cada ampolla bebible contiene: Aspartato de arginina,5 g
 Excipientes: Sorbitol solución al 70% (2 g), sacarosa (1,3 g), ácido cítrico monohidrato, sacarina sódica (13 mg), esencia de frambuesa, sorbato de potasio (E202), agua desionizada, nipagin M (E218), nipasol M (E216), c.s.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Los componentes de POTENCIATOR son dos aminoácidos que participan en el restablecimiento de las reservas proteicas.

INDICACIONES: Prevención de estados carenciales de aminoácidos por ingestión insuficiente de proteínas debido a regímenes vegetarianos, falta de apetito, convalecencias.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS: No se han descrito.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave.

PRECAUCIONES: Las personas con problemas de retención urinaria, sólo lo tomarán bajo control médico. No tomar de forma continuada. En caso de agravamiento o persistencia de los síntomas, consultar al médico.

INCOMPATIBILIDADES: No se han descrito.

REACCIONES ADVERSAS: En algunos casos reacciones alérgicas. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

ADVERTENCIAS: Uso durante el embarazo y lactancia

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Las mujeres en período de lactancia no deben utilizar este medicamento sin consultar al médico.

Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene 1,3 g de sacarosa por ampolla bebible, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos. Este medicamento contiene 1,4 g de sorbitol por ampolla bebible. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Por contener sorbato de potasio como excipiente es perjudicial para pacientes con dietas pobres en potasio. El exceso de potasio puede producir, después de la administración oral, molestias de estómago y diarrea.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía oral.

Menores de 2 años: no se recomienda su uso. **De 2 a 6 años:** sólo bajo prescripción médica. **De 6 a 12 años:** 1 ampolla al día o la dosis que el médico indique. **Mayores de 12 años y Adultos:** 1 ampolla dos veces al día.

Se pueden tomar diluidas en un poco de agua o zumo de frutas al final de las comidas principales.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO:



1. Separar la ampolla.



2. Rasgar la lengüeta de la parte superior con un movimiento giratorio.



3. Después de invertirla, apretar la ampolla y verter el contenido en un vaso.

TRATAMIENTO EN CASO DE INTOXICACIÓN O SOBREDOSIS: La ingestión continuada o accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales (diarreas, náuseas, vómitos). Consultar al médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al médico.

PRESENTACIÓN: Envase con 20 ampollas.

Venta sin receta médica. Almacénese a temperatura no superior a 30°C. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

POTENCIATOR® 5g Aspartate d'Arginine

FORME PHARMACEUTIQUE: Solution orale en ampoules buvables.

COMPOSITION: Chaque ampoule buvable contient: Aspartate d'Arginine,5 g
 Excipients: Solution de sorbitol à 70% (2 g), saccharose (1,3 g), acide citrique monohydrate saccharine sodique (13 mg), essence à la framboise, sorbate de potassium, eau deionisée, nipagin M (E218), nipasol M (E216), q.s.

ACTION PHARMACOLOGIQUE: Les composants de POTENCIATOR sont deux acides aminés, qui interviennent dans le rétablissement des réserves protéiques.

INDICATIONS: Prévention des carences en acides aminés et insuffisance d'apport protéinique causés par des déficits alimentaires, manque d'appétit ou convalescence.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET ALIMENTS: On n'en connaît aucune.

CONTRE-INDICATIONS: Hypersensibilité ou allergie aux composants du produit. Insuffisance rénale ou hépatique grave.

PRÉCAUTIONS: A employer sous contrôle médical chez les patients souffrant de rétention urinaire. Ne pas employer de façon continue.

En cas d'aggravation ou de persistance des symptômes, consulter un médecin.

INCOMPATIBILITÉS: On n'en connaît aucune.

RÉACTIONS ADVERSES: Des réactions allergiques ont été observées chez certains patients.

En cas d'effet indésirable non décrit, consulter un médecin ou un pharmacien.

MISES EN GARDE: Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Chez la femme enceinte, ou susceptible de l'être, prendre l'avis d'un médecin avant d'utiliser ce médicament. La consommation de médicaments pendant la grossesse peut être dangereuse pour l'embryon ou le fœtus et doit être contrôlée par un médecin.

Les femmes en période d'allaitement doivent demander l'avis d'un médecin avant de prendre ce médicament.

Mises en garde au sujet des excipients

Ce médicament contient du saccharose (1,3 g par ampoule buvable). Les diabétiques doivent prendre les précautions habituelles. Pas de modification de la vigilance. Ce médicament contient 1,4 g de sorbitol par ampoule buvable. Il peut causer des troubles gastriques et de la diarrhée. Il ne doit pas être administré à des patients à intolérance génétique au fructose.

Le fait de contenir du sorbate de potassium comme excipient le rend nuisible pour les patients à régimes pauvres en potassium. L'excès de potassium peut produire, après l'administration orale, des dérangements d'estomac et de la diarrhée.

**DOSE ET VOIE D'ADMINISTRATION:** Voie orale.

Enfants moins de 2 ans: il est déconseillé d'utiliser ce médicament. **Enfants de 2 à 6 ans:** uniquement sous prescription médicale. **Enfants de 6 à 12 ans:** 1 ampoule par jour ou la dose conseillée par le médecin. **Plus de 12 ans et Adultes:** 1 ampoule 2 fois par jour.

Les ampoules doivent être prises en dilution dans un peu d'eau ou de jus de fruits à la fin des repas principaux.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI:

1. Séparer l'ampoule choisie des autres.



2. Déchirer la languette de la partie supérieure en faisant un mouvement giratoire.



3. Mettre l'ampoule en sens inverse, presser et verser son contenu dans un verre.

TRAITEMENT EN CAS D'INTOXICATION OU DE SURDOSE: La prise continue ou accidentelle de doses élevées peut provoquer des réactions gastro-intestinales (diarrhées, nausées, vomissements). Arrêter le traitement et consulter un médecin.

En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, veuillez consulter un médecin.

PRÉSENTATION: Boîte de 20 ampoules.

Sans ordonnance médicale. A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. Garder les médicaments hors de portée des enfants.

POTENCIATOR® 5g Arginine aspartate

DOSAGE FORM: Oral solution in drinkable ampoules.

COMPOSITION: Each ampoule for drinking contains: Arginine aspartate,5 g

Excipients: 70% sorbitol solution (2 g), saccharose (1.3 g), monohydrate citric acid, Saccharin sodium (13 mg), raspberry essence, potassium sorbate (E202), deionized water, nipagin M (E218), nipasol M (E216), s.q.

PHARMACOLOGICAL ACTION: The components of POTENCIATOR are two amino acids which are involved in the replenishment of protein reserves.

INDICATIONS: Prevention of deficiency states of amino acids caused by an insufficient protein intake due to vegetarian diets, lack of appetite, convalescence.

INTERACTION WITH OTHER DRUGS AND FOODS: None reported.

CONTRAINDICATIONS: Hypersensitivity or allergy to any of the components of POTENCIATOR. Severe renal or liver failure.

PRECAUTIONS: Patients with urinary retention problems must only take POTENCIATOR under medical control. POTENCIATOR must not be taken continuously. If symptoms worsen or persist, consult your doctor.

INCOMPATIBILITIES: None reported.

ADVERSE REACTIONS: In some cases, allergic reactions occur.

If any other adverse reaction not previously described is seen, consult your doctor or pharmacist.

WARNINGS: Use during pregnancy and nursing

If you are pregnant or you think you could be pregnant, consult your doctor before taking this drug. The use of drugs during pregnancy can be dangerous for the embryo or fetus and must be monitored by your doctor.

Nursing women must not use this drug without consulting their doctor.

Warning regarding excipients: This drug contains 1.3 g of saccharose per ampoule, which should be taken into account by diabetic patients.

This drug contains 1.4 g of sorbitol per drinkable ampoule. It may cause upset stomach and diarrhoea. It should not be used in patients with hereditary fructose intolerance. The drug contains potassium sorbate as an excipient, which is harmful to patients with low potassium diets. Excess potassium, following oral ingestion, may cause stomach upset and diarrhoea.

DOSE AND METHOD OF ADMINISTRATION: Oral way.

Children under 2 years: is not recommended the use of this drug. **Children from 2 to 6 years:** only if prescribed by your doctor. **Children from 6 to 12 years:** 1 ampoule or the dose recommended by your doctor. **Above 12 years and Adults:** 1 ampoule twice a day.

The contents of the ampoule can be taken diluted with some water or fruit juice at the end of the main meals.

INSTRUCTIONS FOR ADEQUATE ADMINISTRATION OF THE PREPARATION:

1. Detach the ampoule.



2. Tear the tab at the top of the ampoule with a twisting motion.



3. After turning it upside down, press the ampoule and pour its contents in a glass.

TREATMENT IN CASE OF INTOXICATION OR OVERDOSE: Continued or accidental intake of large doses may cause gastrointestinal discomfort (diarrhea, nausea, vomiting). Consult your doctor.

In case of overdosage or accidental intake, consult the doctor.

PRESENTATION: Package containing 20 ampoules.

No medical prescription required. Do not store above 30°C. Keep drugs out of reach of children.

TITULAR/TITULAIRE/PRODUCT LICENCE HOLDER

IQUINOSA FARMA
PARQUE EMPRESARIAL "CRISTALIA"
Vía de los Poblados nº 3, Edificio 2, 2ª izda.
28033 Madrid
(España - Espagne - Spain)
FAES GRUPO

FABRICANTE/FABRICANT/MANUFACTURED

FAES FARMA, S.A.
C/ Máximo Aguirre, 14
48940 Leioa
(España - Espagne - Spain)