

Núcleo C.M.P. Forte

Actividad

Núcleo CMP Forte aporta los grupos fosfato necesarios en la unión de los monosacáridos con las ceramidas, para formar cerebrosidos y ácidos fosfatídicos que constituyen esfingomielina y glicerofosfolípidos, componentes principales de la vaina de mielina, con lo que se consigue unas mayores propiedades tróficas para la maduración y regeneración axonal del tejido nervioso.

Composición

	Por cápsula	Por ampolla liofilizada
Citidín-5'-monofosfato disódico (CMP sal disódica)	5 mg	10 mg
Uridín-5'-trifosfato trisódico (UTP sal trisódica)		
Uridín-5'-difosfato disódico (UDP sal disódica)		
Uridín-5'-monofosfato disódico (UMP sal disódica) en total	3 mg	6 mg
(equivalente a 1,330 mg de Uridina y 2,660 mg de Uridina, respectivamente)		
Excipiente	C.S.	C.S.
Por ampolla disolvente:		
Cloruro sódico		
Vehículo acuoso c.s. 2 ml		

Indicaciones

Tratamiento de las neuropatías de origen osteoarticular (ciática, radiculitis, etc.), metabólico (polineuritis diabética, alcohólica, etc), infeccioso (herpes zóster) y a frigore. Neuralgia del Facial, Trigemino, Intercostal, Lumbago.

Posología, forma y duración del tratamiento

Núcleo CMP Forte inyectables se administra por vía intramuscular.

Adultos: 1 inyectable diario por vía intramuscular.

Niños: 1 inyectable cada 2 días por vía intramuscular.

Núcleo CMP Forte cápsulas se administra por vía oral.

Adultos: 1 ó 2 cápsulas 2 veces al día.

Niños: 1 cápsula 2 veces al día. Según criterio médico.

Precauciones de empleo (Inyectables)

Introducir la totalidad del contenido de la ampolla disolvente en la ampolla liofilizada, agitar hasta disolver totalmente el contenido de esta. Inyectar por vía intramuscular.

Contraindicaciones

No se conocen. A menos que exista una alergia a cualquiera de los componentes.

Reacciones adversas

No se han descrito, pero si se produce cualquier reacción adversa achacable a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Interacciones

No se conocen.

Uso en el embarazo

No está contraindicado su uso en embarazo, no obstante, se aconseja que la pauta de administración sea establecida por el médico.

Medidas a tomar en caso de sobredosis

Dada la escasa toxicidad del preparado no se prevé la intoxicación ni aún la accidental.

Forma farmacéutica y contenido.

- Envase conteniendo 3 ampollas liofilizadas y 3 ampollas disolventes.

- Envase conteniendo 30 cápsulas.

Condiciones de conservación y plazo de validez.

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños

Núcleo C.M.P. Forte

Activity

Núcleo CMP Forte provides the phosphate groups necessary for the union of the monosaccharides with ceramins, to form the cerebrosides and phosphatidic acids constituting the sphingomyelin and glycerophospholipids, main components of the myelin sheath, thus achieving greater trophic properties for the maturation and axonal regeneration of the nervous tissue.

Composition

	Per capsule	Per lyophilized ampoule
Cytidine-5'-disodium monophosphate (CMP disodium salt).....	5 mg	10 mg
Uridine-5'-trisodium triphosphate (UTP trisodium salt)		
Uridine-5'-disodium diphosphate (UDP disodium salt)		
Uridine-5'-disodium monophosphate (UMP disodium salt) on the whole ...	3 mg	6 mg
(equivalent to 1.330 mg of Uridine and 2.660 mg of Uridine, respectively)		
Excipient	q.s.	q.s.
Per ampoule of solvent:		
Sodium chloride		
Aqueous vehicle, q.s. 2 ml.		

Indications

Treatment of neuropathies of osteoarticular (sciatica, radiculitis, etc.), metabolic (diabetic, alcoholic polyneuritis, etc.), infectious (herpes zoster) origin, and a frigore. Neuralgia of the Facial, Trigeminal, Intercostal, Lumbago.

Dosage, form and duration of treatment

Núcleo CMP Forte injections is administered by intramuscular route.

Adults: 1 injection daily by intramuscular route.

Children: 1 injection every 2 days by intramuscular route.


Núcleo CMP Forte capsules is administered by oral route.

Adults: 1 or 2 capsules 2 times daily.

Children: 1 capsule 2 times daily. As prescribed by physician.

Precautions for use (Injections)

Introduce the whole contents of the ampoule of solvent into the lyophilized ampoule, stir till completely dissolving the contents of the latter. Inject by intramuscular route.

 Ferrer grupo	Escala 1:1	Código interno 3785	Prospecto Núcleo C.M.P. Forte IFE IMA (1/2)		
	Material Papel blanco satinado tipo lito 50 g/m ²	Dimensiones 280x175 mm	Plegado Bobina	Fecha 10/1/05	
Oficina Técnica	Referencia nº 3785/1-0411	Anula a 1786/6-0110	Motivo Adaptación a perfil máquina IMA	Prueba b	
Aprobado:				Realización Bardolet & Co	
Fecha:	Tintas ■ Negro (100%)				

Contraindications

Are not known. Unless that there exists an allergy to any of the components.

Adverse reactions

Have not been described, but if any adverse reaction attributable to the taking of the medicament appears, consult your physician or pharmacist.

Interactions

Are not known.

Use during pregnancy

Its use during pregnancy is not contraindicated, however, it is recommended that the dosage pattern is established by the physician.

Measures to be taken in case of overdose

Given the scarce toxicity of the preparation, poisoning is not foreseen, even by accident.

Pharmaceutical form and contents

- Package containing 3 lyophilized ampoules and 3 ampoules of solvent.
- Package containing 30 capsules.

Conditions for the preservation and validity time

This medicament must not be used after the date of expiry stated on the package.

Medicaments must be kept out of reach and sight of children

Núcleo C.M.P. Forte

Activité

Le *Núcleo CMP Forte* apporte les groupes phosphate nécessaires dans l'union des monosaccharides avec les céramines, pour former les cébrosides et les acides phosphatidiques qui constituent la sphingomyéline et les glycérophospholipides, principaux composants de la gaine de myéline, en obtenant ainsi de plus grandes propriétés trophiques pour la maturation et la régénération axonale du tissu nerveux.

Composition

	Par capsule	Par ampoule lyophilisée
Cytidine-5'-monophosphate disodique (CMP sel disodique).....	5 mg	10 mg
Uridine-5'-triphosphate trisodique (UTP sel trisodique)		
Uridine-5'-diphosphate disodique (UDP sel disodique)		
Uridine-5'-monophosphate disodique (UMP sel disodique) au total	3 mg	6 mg
(équivalent à 1,330 mg d'Uridine et 2,660 mg d'Uridine, respectivement)		
Excipient	q.s.	q.s.
Par ampoule de dissolvant:		
Chlorure de sodium		
Véhicule aqueux, q.s.		

Indications

Traitement des neuropathies d'origine ostéoarticulaire (sciatique, radiculite, etc.), métabolique (polynévrite diabétique, alcoolique, etc.), infectieuse (herpès zoster) et à frigore. Névralgie faciale, du trijumeau, intercostale, Lumbago.

Posologie, forme et durée du traitement

Le *Núcleo CMP Forte* injections est administré par voie intramusculaire.

Adultes: 1 injection par jour par voie intramusculaire.

Enfants: 1 injection tous les 2 jours par voie intramusculaire.

Le *Núcleo CMP Forte* capsules est administré par voie orale.

Adultes: 1 ou 2 capsules 2 fois par jour.

Enfants: 1 capsule 2 fois par jour. Selon l'avis du médecin.

Précautions d'emploi (Injections)

Introduire tout le contenu de l'ampoule de dissolvant dans l'ampoule lyophilisée, agiter jusqu'à dissoudre totalement son contenu. Injecter par voie intramusculaire.

Contre-indications

On n'en connaît pas. A moins qu'il existe une allergie à n'importe quel des composants.

Réactions adverses

Elles n'ont pas été décrites, mais s'il se produit n'importe quelle réaction adverse imputable à la prise du médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Interactions

On n'en connaît pas.

Utilisation pendant la grossesse

Son utilisation n'est pas contre-indiquée pendant la grossesse, cependant, on recommande que la règle d'administration soit établie par le médecin.

Mesures à prendre en cas de surdosage

Etant donné la rare toxicité de la préparation, on ne prévoit pas l'intoxication, même pas par accident.

Forme pharmaceutique et contenu

- Emballage contenant 3 ampoules lyophilisées et 3 ampoules de dissolvant.
- Emballage contenant 30 capsules.


Conditions de conservation et délai de validité

Ce médicament ne doit pas être utilisé après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Gardez les médicaments hors de la portée et de la vue des enfants

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Barcelona (España/Spain/Espagne)

3785/1-0411

 Ferrer grupo	Escala 1:1	Código interno 3785	Prospecto Núcleo C.M.P. Forte IFE IMA (2/2)		
	Material Papel blanco satinado tipo lito 50 g/m ²	Dimensiones 280x175 mm	Plegado Bobina	Fecha 10/1/05	
Oficina Técnica	Referencia nº 3785/1-0411	Anula a 1786/6-0110	Motivo Adaptación a perfil máquina IMA	Prueba b	
Aprobado:				Realización Bardolet & Co	
Fecha:	Tintas ■ Negro (100%)				