140

10 10

10

74

175

Sentido lectura código Laetus

168

Psico-soma®

Acción farmacológica
Psico-soma contiene como principio activo el Bromhidrato de Glutamato de Magnesio (BGM síntesis Ferrer) que normaliza la excitabilidad nerviosa y produce una sedación psíquica sin mermar la capacidad intelectual y de respuesta del individuo.

Composición

	Por 100 ml
Bromhidrato de glutamato de magnesio	3,0 g
Prometazina Clorhidrato	0,18 g
Excipientes, c.s.	(contiene sacarina sódica)

Indicaciones
Distonías neurovegetativas. Trastornos somáticos de tipo funcional: palpitaciones, insomnio, taquicardia, opresión precordial, espasmos del tubo digestivo. Estados de nerviosismo, agitación y ansiedad. Tics nerviosos. En general en todas las afecciones de origen psico-somático.
Indicaciones electivas de la infancia: Insomnio. Terror nocturno. Enuresis. Irritabilidad. Nerviosismo. Tics.

Posología
Adultos: 10 ml 2 o 3 veces al día.
Niños: Hasta 2 años: 2,5 ml 2 veces al día.
De 2 a 4 años: 5 ml 2 veces al día.
De 4 a 7 años: 10 ml 2 veces al día.
Mayores de 7 años: 10 ml 2 ó 3 veces al día.
En caso de insomnio o terror nocturno se recomienda administrar 5-10 ml antes de acostarse.

Cada 5 ml contienen 150 mg de Bromhidrato de glutamato de magnesio y 9 mg de Prometazina clorhidrato.

ESTAS DOSIS PUEDEN MODIFICARSE A CRITERIO DEL MEDICO.

Contraindicaciones
Estados hipotensivos. Insuficiencia cardíaca o respiratoria. Psicopatía depresiva.

Efectos secundarios
Puede producir somnolencia que desaparece al ajustar la dosis.

Interacciones
No se conocen. Se aconseja no administrar con drogas hipotensoras.

Precaución
Administrar con cuidado a personas hipotensas.

Advertencias
Usese con cuidado, puede producir somnolencia. Uso prolongado solo bajo vigilancia médica.

Embarazo
Aunque las pruebas de teratogenia han demostrado su inocuidad se aconseja no utilizar durante los 3 primeros meses de gestación.

10

140

10 10

10

74

175

Sentido lectura código Laetus

168

Sobredosificación
Dada la escasa toxicidad del preparado no se prevé la aparición de síntomas de intoxicación por sobredosis.

Presentación
Frasco con 90 ml de solución.

No dejar a la vista y alcance de los niños

Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Barcelona (España/Spain) 5001380/7-0807

175

10

ferrer	**Escala** 1:1	**Código interno** 5001380	**Prospecto** Psico-soma líquido IFE	**Nº Perfil** P175x140SP
Oficina Técnica	**Material** Papel tipo lito o rotoform blanco de 50 g/m²	**Dimensiones** 175x140 mm	**Plegado** Sin plegar	**Fecha** 10/12/08
				Prueba C
Aprobado:	**Referencia nº** 5001380/7-0807	**Anula a** 5001380/6-0503	**Motivo** Cambio de texto sólo solución, se elimina texto de grageas, añadir laetus 168.	**Realización** Ferrer
Fecha:	**Tintas** Negro (100%) Perfil (100%)			