

Información

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH · 81366 Munich · Alemania

Luivac[®] comprimidos

En infecciones recurrentes de las vías respiratorias

Composición

1 comprimido contiene:

3 mg de lisado de por lo menos 1×10^9 gérmenes cada uno de

Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Haemophilus influenzae.

Indicaciones

En infecciones recurrentes de las vías respiratorias como bronquitis, rinitis, sinusitis, otitis, faringitis y laringitis.

Contraindicaciones

Si sufre de una inflamación gastrointestinal aguda, no debería tomar Luivac. Debido a la poca experiencia y a la posibilidad de interacciones complejas, el producto no debe ser usado en pacientes con enfermedades autoinmunes. Los comprimidos no deberían tomarse durante el embarazo, ya que hasta ahora no existen conocimientos seguros al respecto. No hay inconvenientes de tomar Luivac durante la lactancia.

Efectos secundarios

En general Luivac se tolera bien. En pacientes hipersensibles se observaron en ocasiones leves molestias gastrointestinales. En casos raros se presentaron reacciones cutáneas alérgicas, localmente limitadas (exantema). En casos muy raros fue reportado artralgia y trombocitopenia.

Interacciones

Hasta el presente no se han observado intolerancias de Luivac respecto a otros medicamentos. En un tratamiento simultáneo con medicamentos que supriman la defensa inmunitaria endógena (inmunosupresivos), sin embargo, hay que contar con una disminución del efecto de Luivac.

Dosificación

Si no hay otra prescripción facultativa, adultos y niños toman un comprimido diario. El comprimido debería tragarse en la mañana, en ayunas, con un poco de líquido. El tratamiento se extiende por un periodo de 28 días. Después de 28 días sin tratamiento sigue otro periodo de tratamiento de 28 días.

Toma	Pausa	Toma
28 días	28 días	28 días

Si necesario su médico le podrá recetar otros periodos de tratamiento. En caso de una infección aguda, Luivac no puede reemplazar un tratamiento con antibióticos, pero puede tomarse al mismo tiempo.

Presentaciones

Envases con 14 y 28 comprimidos

Medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

